

# Agrothal

com antiinflamatório

uso veterinário

Antibiótico com antiinflamatório não hormonal

## INDICAÇÕES:

AGROTHAL com antiinflamatório é indicado para bovinos, eqüinos, caprinos, ovinos e suínos, no tratamento de doenças infecciosas primárias e secundárias, causadas por germes sensíveis à penicilina, acompanhadas de processos inflamatórios agudos e crônicos que acometem os tratos gastro-intestinal, respiratório, genito-urinário e epitelial, além de tecidos moles e articulações.

Entre as infecções causadas às várias espécies animais podemos relacionar as seguintes:

### -Bovinos:

Pneumonia bacteriana (*Pasteurella multocida*), septicemia hemorrágica (*Pasteurella multocida*), pododermatites (*Fusobacterium necrophorum*), mastites (*Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium pyogenes*), metrites (*Corynebacterium pyogenes*), pielonefrites (*Corynebacterium renale*), hemoglobinúria bacilar (*Clostridium haemoliticum*), actinomicose (*Actinomyces bovis*), fases iniciais do carbúnculo sintomático (*Clostridium chauvoei*) e edema maligno (*Clostridium septicum*), abscessos e infecções de ferimentos (*C. pyogenes*, *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp*), hepatite necrótica infecciosa (*Clostridium novyi*), artrites (*C. pyogenes*), e sinovites (*S.aureus*).

### -Eqüinos:

Tétano (*Clostridium tetani*), garrotilho (*Streptococcus equi*), pneumonia corinebacteriana dos potros (*Corynebacterium equi*), infecções respiratórias e cólera dos potros (*Pasteurella multocida*) septicemia hemorrágica (*Pasteurella multocida*), abscessos e infecções de ferimentos (*Staphylococcus spp* e *Streptococcus spp*).

### -Suínos:

Pneumonia bacteriana (*Pasteurella multocida*), septicemia hemorrágica (*Pasteurella multocida*), mastites (*Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium pyogenes*), metrites (*Corynebacterium pyogenes*), abscessos e infecções de ferimentos (*Staphylococcus spp* e *Streptococcus spp*), erisipela (*Erysipelotrix rhusiopathiae*), epidermite infecciosa (*Staphylococcus hyicus*, *S. hyos*).

### -Ovinos e Caprinos:

Infecções respiratórias e septicemia hemorrágica (*Pasteurella multocida*), pododermatites (*Fusobacterium necrophorum*), fases iniciais do carbúnculo hemático (*Bacillus anthracis*), edema maligno (*Clostridium septicum*), carbúnculo sintomático (*Clostridium chauvoei*), hepatite necrótica infecciosa (*Clostridium novyi*), abscessos e infecções após castração e corte de cauda (*Staphylococcus spp* e *Streptococcus spp*), infecções do trato urinário (*Corynebacterium renale*).

## FÓRMULA:

Cada frasco ampola contém:

Benzilpenicilina procaína	4.000.000 UI
Benzilpenicilina potássica	1.350.000 UI

Cada ampola de diluente contém:

Diclofenaco Sódico	225 mg
Água bidestilada estéril	15ml

## POSOLOGIA:

O produto, quando reconstituído de acordo com as instruções de uso, tem as seguintes dosagens recomendadas:

\* Para bovinos, Eqüinos, Ovinos, Caprinos, Suínos: 1ml para cada 30 a 40 Kg de peso corporal.

Estas posologias correspondem à 8.000 a 11.000 UI/Kg de peso corporal, e podem ser modificadas à critério do Médico Veterinário. Repetir diariamente o tratamento. Continuar o tratamento por um período de no mínimo 48 horas após o desaparecimento de todos os sinais da doença.

## ADMINISTRAÇÃO:

A suspensão deve ser preparada, no momento do uso, com 15 ml do diluente:

- Tirar o disco de metal sobre a rolha de borracha e desinfetá-la com álcool.
- Usando seringa e agulha esterilizadas de diâmetro não inferior a 0,8 mm, injetar o diluente no interior do frasco. Retirar a agulha e agitar energeticamente até homogeneizar completamente a suspensão.
- Injetar um pouco de ar no interior do frasco e aspirar lentamente a solução.

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

A administração deve ser feita em injeção intramuscular profunda.

Não é recomendável injetar doses superiores a 10 ml num mesmo local.

## INTERVALO ENTRE DOSES:

Repetir diariamente o tratamento, ou seja, uma aplicação a cada 24 horas.

Continuar o tratamento por no mínimo 48 horas após o desaparecimento de todos os sinais da doença.

## PRECAUÇÕES:

Obedecer as dosagens e recomendações para o uso do produto.

O produto deve ser utilizado logo após a sua preparação.

Usar agulhas e seringas estéreis.

Não aplicar via intravenosa.

Conservar em local fresco e seco à temperatura de 4° a 25°C, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

Não abater os animais antes de 30 dias após o término do tratamento.

Não utilizar o leite para consumo humano por 72 horas após o término do tratamento.

**CONTRA-INDICAÇÕES:**

Não aplicar via intravenosa.

Não utilizar outros antiinflamatórios em associação com AGROTHAL com antiinflamatório.

Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Não utilizar em animais com grave disfunção renal.

Os preparados que contêm procaína, administrados em doses elevadas por via intramuscular, poderão produzir, principalmente em eqüinos, excitação nervosa (incoordenação, ataxia e excitabilidade). Não se deve, portanto, administrar o produto aos cavalos de hipódromo durante as duas semanas que precedem a sua participação em competições, a fim de evitar que sejam positivos aos resultados da prova de controle da procaína.

Depois de ter sido administrada às fêmeas gestantes de suínos, a Benzilpenicilina Procaína pode desencadear sintomas nervosos, enquanto que doses terapêuticas têm produzido abortos, conseqüentemente, o produto é contra-indicado no período de gestação dessa espécie.

**EFEITOS ADVERSOS:**

As reações alérgicas às Penicilinas tem como sinais clínicos principais, as erupções cutâneas, angioedema e anafilaxia.

Hiperpotassemia (hipercalcemia) e arritmia cardíacas podem ocorrer quando se administra a Benzilpenicilina Potássica por via intravenosa.

**APRESENTAÇÃO:**

Caixa com 24 frascos ampola e 24 ampolas de diluente, ou caixa com 6 frascos ampola e 6 ampolas de diluente.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 4730 em 11/07/94.

Resp. Técnico: Dr. A. Javier Carracedo CRMV-SP nº 7896.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

**Proprietário:**

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda - Divisão Minerthal Saúde Animal.

Variante Lucas Nogueira Garcez, 765 - parte A

CEP 12324-000 - Jacareí - SP

Tel/Fax: (11) 3045-5447

SAC 0800 622 666

E-mail: minerthal@minerthal.com.br

Web site: <http://www.minerthal.com.br>

CNPJ: 05.451.258/0001-28

Inscrição Estadual: 392.212.624.110

Indústria Brasileira

**Fabricante:**

Jofadel Indústria Farmacêutica S.A.

Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100 - Varginha-MG

CNPJ: 17.843.582/0001-70

I.E.: 707.105.035.0066

Data do vencimento: 24 (vinte e quatro) meses após a data de fabricação.