

Cefthal

Ceftiofur sódico
injetável

uso veterinário

Antibiótico injetável

FÓRMULA:

Cada 100mL do produto reconstituído contém:

Ceftiofur sódico 5g
Veículo q.s.p 100mL

INDICAÇÕES:

CEFTHAL é indicado para:

Bovinos: no tratamento da febre de embarque e pneumonia associada a *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Haemophilus somnus*; e necrobacilose associada a *Fusobacterium necrophorum* e *Bacteroides melanogenicus*.

Suínos: no tratamento e controle da enfermidade respiratória bacteriana suína associada a *Actinobacillus (Haemophilus), pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* e *Streptococcus suis* tipo 2.

Equinos: no tratamento e controle da enfermidade respiratória associada a *Streptococcus zooepidemicus*.

Aves: no controle da mortalidade primária dos pintos de 1 dia de idade associada a *Escherichia coli*.

Cães: no tratamento das infecções do trato urinário associada a *Escherichia coli* e *Proteus mirabilis*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

CEFTHAL é um antibiótico que deve ser injetado pela via intramuscular profunda (IM). Em casos de administração a cães e pintos de um dia, a administração deve ser feita por via subcutânea (SC).

DOSE:

Espécie	mg de ceftiofur/ Kg de peso vivo	mL de produto reconstituído / Kg de peso vivo
Bovinos	1,0 a 2,0mg/kg	1 a 2mL /50 kg
Suínos	3,0mg/Kg	1mL/16Kg
Equinos	2,0mg/Kg	1mL/25Kg
Cães	2,2mg/Kg	1mL/ 23Kg
Pintos	0,08a 0,20mg/ave	1frasco de 4 gpara 40.000aves.

Deve-se repetir o tratamento a cada 24 horas, por um período de 3 dias.

No caso de aves, o produto deve ser aplicado apenas uma única vez.

Se necessário, e a critério do Médico Veterinário o tratamento pode ser estendido.

CONTRA INDICAÇÕES:

É contra indicado para animais com hipersensibilidade ao ceftiofur.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Não destinar ao consumo humano a carne de animais tratados antes de decorridas 48 horas da última aplicação. Observação: Não administrar em equinos destinados ao consumo humano.

PRECAUÇÕES DE USO:

-Com o auxílio de uma seringa estéril, retire o conteúdo do frasco de diluente e coloque no frasco com o pó, reconstituindo. Agite bem o frasco com o diluente e o pó para que ocorra uma correta reconstituição antes de aplicar.

-Manter o produto em geladeira a uma temperatura de 5 a 8 ° C até o momento de sua reconstituição.

-Após reconstituído, este pode ser mantido em temperatura ambiente durante 12 horas e durante 5 dias na geladeira.

Conservar sob refrigeração entre 5°C e 8°C, ao abrigo da luz solar.

Mantenha este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 8.594 em 06/05/2003.

APRESENTAÇÕES:

Frasco ampola, contendo o ceftiofur (fármaco ativo) em forma de pó (apresentações de 4,0 g, 1,0 g e 0,4 g) e frasco diluente (apresentações de 80 mL, 20 mL e 20mL respectivamente) apresentada em cartuchos contendo os dois frascos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dr. A. Javier Carracedo CRMV-SP n° 7896

PROPRIETÁRIO:

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda - Divisão Minerthal Saúde Animal

Variante Lucas Nogueira Garcez 765 - parte A

CEP 12324-000 Jacareí-SP

Tel/Fax: (11) 3045 5447

SAC: 0800 622 666

E-mail: minerthal@minerthal.com.br

Website: <http://www.minerthal.com.br>

CNPJ: 05.451.258/0001-28

Inscrição Estadual: 392.212.624.110

Indústria Brasileira

FABRICANTE:

Jofadel Indústria Farmacêutica S.A.

Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100 - Varginha-MG

CNPJ: 17.843.582/0001-70

I.E.: 707.105.035.0066

Data do vencimento: 24 (vinte e quatro) meses após a data da fabricação