

# Florthal

florfenicol injetável

uso veterinário

## Antibiótico Injetável para Bovinos à base de Florfenicol

### DESCRIÇÃO:

FLORTHAL é uma solução de florfenicol, que é um antibiótico sintético de amplo espectro, apresentando atividade frente a muitas bactérias gram negativas e gram positivas.

O florfenicol atua na síntese protéica bacteriana, apresentando principalmente uma ação bacteriostática.

### FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Florfenicol 30,00g  
Veículo q.s.p. 100,00mL

### INDICAÇÕES:

FLORTHAL é principalmente indicado no tratamento da Doença Respiratória Bovina (Febre dos Transportes) causada por *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Haemophilus somnus* e das diarreias decorrentes de enterites infecciosas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella sp.* e por infecções bacterianas secundárias a infecções virais.

FLORTHAL também é indicado no tratamento das pododermatites infecciosas causadas por *Bacteroides nodosus* e *Bacteroides melaninogenicus*.

Espécie animal ao qual se destina: bovinos.

### VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Uso parenteral.

Administrar pela via intramuscular, preferencialmente, na tábua do pescoço.

Utilizar equipamento estéril, obedecendo as normas de assepsia.

Dividir doses maiores ou iguais a 10 mL em dois pontos de aplicação.

### POSOLOGIA:

A posologia indicada é de 20 mg/kg de peso pela via intramuscular, que equivale a 1 mL para cada 15 kg de peso. Uma segunda aplicação pode ser necessária com um intervalo de 48 horas.

Um frasco-ampola de 30 mL é suficiente para realizar uma administração em um bovino adulto de 450 kg.

### CONTRA INDICAÇÕES:

O produto deve ser utilizado criteriosamente em animais portadores de hematopatias.

Não administrar em bezerras com menos de 1 mês de idade.

Não utilizar em vacas leiteiras com mais de 20 meses de idade, já que estas podem apresentar resíduos da droga no leite.

Eventualmente, podem ocorrer reações no local de aplicação, que desaparecem sem a necessidade de tratamento.

FLORTHAL é um produto novo à base de florfenicol que, como demonstrado em recentes pesquisas, é seguro e eficaz quando utilizado corretamente, no entanto, ainda não foram determinados resultados conclusivos no que se refere a alterações reprodutivas, gestacional e período de lactação.

Não administrar conjuntamente com as Penicilinas, Cefalosporinas e Quimioterápicos, em decorrência do antagonismo "in vitro" e "in vivo".

### PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO:

Não abater animais destinados ao consumo humano, antes de decorridos 28 dias do último tratamento.

O produto não deve ser utilizado nos bovinos produtores de leite, durante a fase de lactação, quando os mesmos forem destinados ao consumo humano.

### PRECAUÇÕES GERAIS:

Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Lavar bem as mãos após a manipulação do produto.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

### APRESENTAÇÕES:

Frascos-ampola contendo 30 mL e 100 mL, acondicionados em cartuchos individuais.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7939 em 24/09/2001.

Resp. Técnico: Dr. A. Javier Carracedo CRMV-SP nº 7896.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

### Proprietário:

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda - Divisão Minerthal Saúde Animal.

Variante Lucas Nogueira Garcez, 765 - parte A

CEP 12324-000 - Jacareí - SP

Tel/Fax: (11) 3045-5447

SAC 0800 622 666

E-mail: [minerthal@minerthal.com.br](mailto:minerthal@minerthal.com.br)

Web site: <http://www.minerthal.com.br>

CNPJ: 05.451.258/0001-28 I.E.: 392.212.624.110

Indústria Brasileira

### Fabricante:

Jofadel Indústria farmacêutica S.A.

Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100 - Varginha - MG

CNPJ: 17.843.582/0001-70

I.E.: 707.105.035.0066

Data do vencimento: 24 (vinte e quatro) meses após a data de fabricação.