

Ivermecthal

uso veterinário

Solução de Ivermectina 1% injetável para o controle e tratamento de parasitas internos e externos nos bovinos

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Ivermectina 1,0 g
Veículo q.s.p. 100 mL

INDICAÇÕES:

IVERMECTHAL controla e trata as verminoses gastrintestinais e pulmonares, bernês, piolhos, sarnas, e auxilia no controle do carrapato dos bovinos.

IVERMECTHAL também atua prevenindo o aparecimento de bicheiras no umbigo dos bezerras recém-nascidos e na ferida decorrente da castração dos bezerras.

IVERMECTHAL é especialmente indicado no controle e tratamento de:

Vermes redondos gastrintestinais: *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.* e *Oesophagostomum spp.*

Vermes pulmonares: *Dictyocaulus spp.*

Larvas de moscas: Berne: *Dermatobia hominis* Míiases: *Cochliomyia hominivorax*.

IVERMECTHAL atua na prevenção do desenvolvimento de bicheiras umbilicais e nas feridas decorrentes das intervenções cirúrgicas de castração e da descorna dos bovinos, não sendo entretanto dispensada a observação diária e também o uso de produtos cicatrizantes, larvicidas e repelentes até a completa cicatrização do ferimento.

Carrapatos: *Boophilus microplus*

IVERMECTHAL auxilia no controle dos carrapatos quando utilizado como parte de um programa de controle.

MODO DE USAR:

IVERMECTHAL deve ser aplicado pela via subcutânea, preferencialmente na frente ou atrás da paleta. Utilizar equipamento estéril e obedecer às normas de assepsia.

DOSAGENS: A dosagem indicada para bovinos em todas as faixas etárias é de 1 mL para 50 kg de peso, conforme tabela abaixo, equivalente a 200 µg de princípio ativo por kg de peso.

PESO DO ANIMAL	DOSAGEM	PESO DO ANIMAL	DOSAGEM
até 50 kg	1,0 mL	de 301 a 350 kg	7,0 mL
de 51 a 100 kg	2,0 mL	de 351 a 400 kg	8,0 mL
de 101 a 150 kg	3,0 mL	de 401 a 450 kg	9,0 mL
de 151 a 200 kg	4,0 mL	de 451 a 500 kg	10,0 mL
de 201 a 250 kg	5,0 mL	de 501 a 550 kg	11,0 mL
de 251 a 300 kg	6,0 mL	de 551 a 600 kg	12,0 mL

Obs.: Para animais mais pesados, manter a mesma proporção de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal.

PRECAUÇÕES GERAIS: Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.

Lave bem as mãos após a manipulação do produto.

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.

Não reutilizar as embalagens vazias.

As embalagens vazias devem ser enterradas ou queimadas.

Manter a embalagem fechada.

PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO: Bovinos destinados ao consumo humano não devem ser tratados dentro de 35 dias antes do abate.

Não administrar a fêmeas leiteiras lactantes.

CONTRA-INDICAÇÕES: Este produto não deve ser administrado pelas vias endovenosa ou intramuscular.

Eventualmente podem ocorrer reações no local de aplicação, que desaparecem sem a necessidade de tratamento.

Na posologia indicada, o produto não apresenta reações adversas, e pode ser usado com segurança mesmo em vacas gestantes.

APRESENTAÇÕES: frascos ampola de plástico contendo 5, 10, 50, 100, 250 e 500 mL.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças.

Responsável Técnico: Dr. A. Javier Carracedo- CRMV-SP nº 7896.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 6453 em 08/07/98.

Proprietário:

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda - Divisão Minerthal Saúde Animal.

Variante Lucas Nogueira Garcez, 765 - parte A

CEP 12324-000 - Jacareí - SP

Tel/Fax: (11) 3045-5447

E-mail: minerthal@minerthal.com.br

Web site: <http://www.minerthal.com.br>

CNPJ: 05.451.258/0001-28 I.E.: 392.212.624.110

Indústria Brasileira

Fabricante:

Tortuga Companhia Zootécnica Agrária

Rua Centro Africana, 219 - Santo Amaro-SP

CNPJ: 56.992.951/0001-49 I.E.: 105.317.954.115

Data do vencimento: 24 (vinte e quatro) meses após a data da fabricação.

Nº da partida e data da fabricação: vide carimbo no rótulo do frasco.