

# Mamithal

com antiinflamatório

uso veterinário

## Pomada Intramamária

Suspensão Intramamária à base de Cefoperazone e Dexametazona

### COMPOSIÇÃO:

Cada seringa de 10 mL contém:

Cefoperazone Sódico	250,0mg
Acetato de Dexametazona	3,0 mg
Veículo q.s.p.	100,0mL

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

MAMITHAL com antiinflamatório é uma suspensão oleosa à base de Cefoperazone que é um antibiótico da família das cefalosporinas de terceira geração. Possui atividade bactericida, atuando frente a uma ampla variedade de germes gram-positivos e gram-negativos, e aeróbios causadores das mastites. Sendo uma cefalosporina de terceira geração, Cefoperazone possui atividade antimicrobiana "in vitro" e maior capacidade de resistir às enzimas beta-lactamase produzidas pela maioria dos patógenos gram-negativos, do que as cefalosporinas de primeira e segunda geração.

MAMITHAL com antiinflamatório é eficaz contra bactérias de difícil controle como as Pseudomonas e Corinebactérias. Testes de laboratório e de campo, realizados no Brasil e exterior, não produziram efeitos colaterais nos animais tratados com MAMITHAL com antiinflamatório sob as mais variadas condições.

### INDICAÇÕES:

MAMITHAL com antiinflamatório é indicado nos casos de mastites clínicas causadas por ampla variedade de bactérias sensíveis ao Cefoperazone Sódico, tais como: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus pyogenes*, *Micrococcus sp*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* (inclusive os produtores de penicilinase), *Staphylococcus epidermidis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Corynebacterium pyogenes*, *Corynebacterium bovis*, *Klebsiella sp*.

### MODO DE USAR E DOSAGEM:

Após esgotar o leite, lavar o teto com água e sabão e enxugá-lo com papel toalha. Injetar o conteúdo de uma seringa e massagear suavemente o teto tratado, de baixo para cima, para que o medicamento alcance as regiões mais altas.

MAMITHAL com antiinflamatório mantém seu efeito terapêutico no interior da glândula mamária por um período prolongado (48 horas) sendo suficiente uma única aplicação para a cura da maioria dos casos. Em casos de maior gravidade, como mastites crônicas e sistêmicas, podem ser necessárias aplicações subseqüentes, sempre com intervalos de 24 horas. Recomenda-se a repetição do tratamento após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

### PRECAUÇÕES:

Não usar o leite das vacas em tratamento com antibiótico para consumo humano.

Animais para consumo humano não devem ser abatidos antes de decorridas 48 horas da última aplicação.

Não destinar ao consumo humano o leite de animais tratados antes de decorridas 84 horas da última aplicação.

Conservar o produto em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças. Armazenar abaixo de 30°C.

### APRESENTAÇÕES:

Caixas contendo 12 seringas descartáveis de 10mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 1309 em 29/01/81.

Resp. Técnico: Dr. A. Javier Carracedo - CRMV-SP nº 7896.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Proprietário e Fabricante::

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda - Divisão Minerthal Saúde Animal.

Variante Lucas Nogueira Garcez, 765 - parte A

CEP 12324-000 - Jacareí - SP

Tel/Fax: (11) 3045-5447

SAC: 0800 940 7677

E-mail: [minerthal@minerthal.com.br](mailto:minerthal@minerthal.com.br) Web site: <http://www.minerthal.com.br>

CNPJ: 05.451.258/0001-28

Inscrição Estadual: 392.212.624.110

Indústria Brasileira

Data do vencimento: 18 (dezoito) meses após a data de fabricação.