

Miosthral



uso veterinário

Cada 100mL contém:

| | |
|---|------------|
| Dicloro Divinil Pirrolidona (D.D.V.P.) | 3,000 g |
| Orto-orto-Dimetil-Para-Nitrofenil-Fosforotioato | 0,027 g |
| Alcatrão Vegetal Esterilizado q.s.p. | 100,000 mL |

MIOSTHAL é impermeável à água. Após poucos minutos, os animais podem ser soltos, mesmo em terrenos molhados, sem que o medicamento perca a eficácia. **CUIDADO - VENENO.** Mesmo sendo de baixa toxidez, se ingerido em quantidades grandes, MIOSTHAL pode produzir intoxicações sérias. Não administrar por via oral. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não guardar ou aplicar junto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Não usar a embalagem vazia.

AVISO AOS SENHORES MÉDICOS:

MIOSTHAL contém substâncias inibidoras da colinesterase. Em caso de acidente, o antídoto é a atropina.

INDICAÇÕES:

É indicado para o tratamento de animais nos seguintes casos: descorna, miíases em geral, frieiras, gabarros, flegmões, castrações, podridão do casco, tratamento de umbigo, brocas, prevenção e tratamento do pietin em ovinos e como proteção aos cascos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Ferimentos: MIOSTHAL deve ser usado diretamente sobre os ferimentos após efetuada a limpeza do local por pincel ou espátula. Deixar secar por poucos minutos para obter a impermeabilização.
- Frieiras: cortar a frieira e aparar o casco retirando todo o tecido necrosado. Aplicar a seguir MIOSTHAL abundantemente. Deixar secar alguns minutos antes de soltar o animal. Repetir a cada 3 dias, quando necessário. Em casos muito graves, fazer bandagem com tecido poroso (gaze, anagem) pincelando MIOSTHAL a cada volta da bandagem.
- Desinfecção do umbigo: cortar o umbigo dos recém-nascidos e aplicar MIOSTHAL deixando secar. Repetir a cada 3 ou 4 dias, se necessário.
- Descorna: após a queima dos botões dos chifres por ferro ou química, pincelar MIOSTHAL uma só vez.
- Sarna: aplicar MIOSTHAL nas partes lesadas. **CUIDADO:** nunca aplicar MIOSTHAL em mais de um terço do corpo do animal de uma só vez. Caso as lesões sejam muito extensas, fazer o tratamento por partes.
- Castrações: pincelar MIOSTHAL no local e nas áreas circunvizinhas.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

APRESENTAÇÕES: Frascos plásticos contendo 200g, 300 g e latas com propelente contendo 500mL.

Licenciado no SDSA(MA) sob nº 2837 em 11/03/88
Res. Técnico: Dr. A. Javier Carracedo CRMV-SP nº 7896

Proprietário e Fabricante:
Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda -
Divisão Minerthal Saúde Animal.
Variante Lucas Nogueira Garcez, 765 - parte A
CEP 12324-000 – Jacareí – SP
Tel/Fax: (11) 3045-5447

SAC: 0800 622 666

Web site: <http://www.minerthal.com.br>

E-mail: minerthal@minerthal.com.br

CNPJ (MF): 05.451.258/0001-28

Inscrição Estadual: 392.212.624.110

Indústria Brasileira.

Data do vencimento: 36 (trinta e seis) meses
após a data da fabricação.